



# PRŮKAZ NEMOCNÉHO OHROŽENÉHO INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU

Pacient: \_\_\_\_\_

Rodné číslo: \_\_\_\_\_

Riziko (zaškrtnout):

- vysoké**  
zvl. chlopnenní protézy, stav po infekční endokarditidě
- střední**  
většina získaných i vrozených vad, hypertrofická  
obstrukční kardiomyopatie
- nizké**  
(profylaxe neindikována): defekt septa síní typu  
ostium secundum, nekalcifikované degenerativní vady

Vydal MUDr.: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefon:

Vydala Česká kardiologická společnost ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP.

Beneš J., Gregor P., Mokráček A.: Infekční endokarditida. Cor et Vasa 2007;49(6):K157-K171.

**Sekretariát ČKS, Pekařská 72, 602 00 Brno**

## PROFYLAXE PŘI VÝKONECH V OBLASTI DUTINY ÚSTNÍ, JÍCNU A KONEČNÍKU

(zákony spojené s krvácením: extrakce zubu, tonzilektomie, gingivektomie, sklerotizace varixů apod.)

<b>amoxicilin</b>	2 g <sup>a,b</sup> p.o.	1 h. předem
<b>Alergie na PNC: klindamycin</b>	450 mg <sup>a</sup> p.o.	1 h. předem
<b>Parenterálně: ampicilin</b>	2 g <sup>a</sup> i.v., i.m.	před výkonem

## PROFYLAXE PŘI CÉVKOVÁNÍ A JINÝCH INVAZIVNÍCH VÝKONECH NA MOČOVÝCH NEBO ŽLUČOVÝCH CESTÁCH

<b>amoxicilin</b>	2 g <sup>a,b</sup> p.o.	1 h. předem
<b>Parenterálně: ampicilin</b>	2 g <sup>a</sup> i.v., i.m.	před výkonem
<b>nebo vankomycin</b>	1 g infuzí trvající 60 min.	

- a) při déletrvajícím výkonu nebo krvácení se za 4 h. podá ještě poloviční dávka ATB  
b) u nemocných s vysokým rizikem je vhodné zvýšit dávkování ATB o 50 %

## PROFYLAXE PŘI VÝKONECH V OBLASTI INFIKOVANÉ KŮŽE NEBO PODKOŽÍ

(incise abscesu, furunklu apod.) – příklady ATB profylaxe

<b>oxacilin</b> .....	2 g <sup>a</sup> p.o., i.v., i.m.
<b>cefalosporin</b> .....	1. generace 2 g <sup>a</sup> p.o., i.v.
<b>klindamycin</b> .....	450 (600) mg <sup>a</sup> p.o. (i.v., i.m.)
<b>vankomycin</b> .....	1 g infuzí trvající 60 min.

**Na infekční endokarditidu nutno pomýšlet u rizikových pacientů vždy při horečce nejasného původu, chřadnutí nebo závažném kardiologickém zhoršení včetně změn srdečních šelestů. Před nasazením antibiotik u horečnatých stavů neznámé etiologie je nutné odebrat alespoň 2 hemokultury!**