


Použití inklisiranu v ambulantní praxi

Zkušenosti jednoho pracoviště

MUDr. Jan Boček, 11.5.2026



Agenda

- Proč inklisiran?
- Cíle práce
- Metodika a soubor
- Výsledky
- Noví pacienti
- Shrnutí

Proč inklisiran?

- léčba se známou účinností
- není centrová léčba
- jednoduché dávkování
- pohodlí pro pacienta

Cíl

Analýza:

- patientské populace
- hladin LDLc
- účinnosti
- nežádoucích účinků

Metodika

- všichni pacienti na aktivní léčbě k 22.10.2025
- aktualizace dat k 30.4.2026
- LDLc
 - před zahájením léčby
 - po 1., 2. a 3. dávce
 - úhradová kritéria
- statistická analýza (popisná statistika, t-test)


Soubor

- 20 pts v sekundární prevenci
- prům. věk 64,9 ($\pm 11,3$) roku
- ženy 40 % (n=8)
- kombinální perorální léčba 11 pts

	statin	ezetimib	k. bempedoová	fibrát
n	13	13	1	2
%	65	65	5	10

Výsledky

Vývoj LDLc



	Vstupně	Po 1. dávce	Po 2. dávce	Po 3. dávce
průměr	3,05	1,59	1,84	1,8
SD	0,9	0,96	1,12	0,92
p		0,00000	0,00000	0,0047
n	20	19	20	12

Průměrný pokles LDc

	po 1. dávce	Po 2. dávce	Po 3. dávce
mmol/l	1,46	1,21	1,25
%	47,8	39,82	41,07

Nespíme na vavřínech

- 6 nových pts. od října 2025 do dubna 2026

Pacient	LDLc vstupní	LDLc po 1. dávce
1	2,33	1,51
2	3,66	2,52
3	4,75	1,36
4	2,24	n/a
5	2,21	1,02
6	2,29	2,38

Děkuji za pozornost!