

Kazuistika

Zpracoval: Rostislav Stříbrný,

Interní odd. Nem. Ivančice: MUDr. T. Madarászová,
prim. MUDr. R. Stříbrný, MUDr. Dominik Černý

CKTCH: MUDr. Pavla Vojtěchová a další

MOÚ Brno: MUDr. D. Adámková Krákorová a další

Lucie, r. 1986

- Do 05/2021 zdráva
- RA: děda IM, ca colon, babička DM, otec DM HT
- GA: pravidelné prohlídky, bpn., bezdětná
- FA: HAK
- Ab: 4 cig./poslední 3 roky, alkohol minim.
- PA, SA: prodavačka nábytku, žije s přítelem


Klinická manifestace

- 10 dnů před přijetím začátek symptomatologie: dušnost, produktivní expektorace (zpětně: postupná progrese námahové dušnosti v řádu týdnů), nahmatala si bulku za pravým m. SCM
- PL: suspekce na covid, expektorancia. Nedostatečný efekt – Azithromycin.
- 31.05.2022: přijetí na spádové int. pracoviště



Status praesens

- 158cm, 74kg, 150/90mmHg, TF 111/min, SpO2 91 %
- Ortopnoe, insp. chrůpky bazálně, oslabené dýchání, šelest na srdci nepopisován
- Laboratorně: hsTnI 107 (norma do 16); Ddim 1,68 (norma do 0,5); CRP 77; glyk. 8,74, Leu 12,3
- Suspekce na plicní embolizaci → CTAG plicnice

CTAG



Echokardiografický náález



Další průběh, kardiochir. řešení

- Transfer k akutnímu kardiochirurgickému řešení
 - Tumor plošně přisedlý k LAA až k zadnímu cípu chlopně, cíp destruován. Infiltrace až na LS. Nejistá radikalita provedeného výkonu
 - Mechanická náhrada mitrální chlopně SJM
- Masters 27

Follow up, další klinický vývoj

- Propuštěna v celkově dobré klinickém stavu, bez subj. obtíží
- FA: Warfarin, Furon 40mg tbl. ½-0-0, Kalnormin tbl. 1-0-1, Neurol tbl. 1-0-0, Zoloft 50mg tbl. 1-0-0, Concor 2,5mg tbl. 1-0-0
- Dg.: High grade sarkom levé síně srdeční

Follow up, další klinický vývoj

- Pooperační CT: nově infiltrát v předním mediastinu 31x22x29
- RT na oblast LS a mediastina
- 01/2022 časný systémový relaps: MTS pravá strana pánve, osteolýza kyčle, MTS omentální burzy; RT na epigastrium a kyčel
- 05/2022 MTS v oblasti lopatky vpravo, 08/2022 MTS levého lýtka

Follow up, další klinický vývoj

- Opakovaná periodická echokardiografická vyš. bez průkazu relapsu v oblasti levé síně, správná funkce mechan. protézy
- Paliativní CHT + RT
- DVT v. poplitea l. sin., recidivující, změna na LMWH+ASA, anemizace HB 77
- Rebiopsie: vřetenobuněčný / intimální sarkom
- Postupná progrese, úmrtí 4.1.2023 (20 měsíců od stanovení dg.)

Srdeční nádory

- Primární (benigní/maligní), sekundární
- Většina prim. nádorů je benigní povahy (75-80 %), nejčastější je myxom
- Incidence 0,001-0,28 % dle autoptických nálezů
- Až polovina maligních nádorů má v době stanovení dg. vzdálené metastázy, prognosticky nepříznivý nález
- Až 70 různých subtypů sarkomů

Závěr

- Intimální sarkom srdce je extrémně vzácná diagnóza
- Prům. přežití 3-12 měsíců
- Popsány pouze kazuistiky
- Včasná diagnostika zůstává velkou výzvou pro nízkou symptomatičnost
- Klinicky často rychlá progrese

Děkuji za pozornost

